

Renseignements destinés au patient

Qu'est-ce que le Bellergal ?

Même si les bouffées de chaleur sont les plus communs symptômes associés à la ménopause, plusieurs femmes présentent plus d'un symptôme. Bellergal est une thérapie non hormonale visant le contrôle des symptômes de la ménopause pour les femmes qui ne peuvent ou ne préfèrent pas être traitées par la thérapie hormonale.

Puisque que Bellergal contient trois ingrédients, il est efficace pour un grand nombre de symptômes tels que les bouffées de chaleur, la transpiration, les étourdissements, la nervosité, l'inquiétude, la fatigue, l'insomnie, les maux de tête, comme par exemple, chez les patients sujets aux états de tension et d'anxiété associés à la ménopause.

Les femmes ménopausées qui souffrent de vaginites atrophiques et d'ostéoporose, requièrent une thérapie spécifique à ces conditions, si nécessaire.

La dose

La dose est d'un Spacetab le matin et un le soir, toutefois votre médecin peut vous recommander une dose plus faible. Vous ne devriez jamais prendre plus de 16 comprimés en une semaine.

Médicaments que vous devriez éviter en prenant le Bellergal

Comme plusieurs autres médicaments, Bellergal peut être affecté par la prise de médicaments supplémentaires (prescrits ou non) et vous devriez donc vous assurer que votre médecin sait si vous prenez d'autres médicaments.

En particulier, vous ne devez pas recourir à Bellergal si vous prenez déjà d'autres antibiotiques (érythromycine, clarithromycine et troléandomycine) ou des inhibiteurs de la protéase (ritonavir, nelfinavir, indinavir).

Votre médecin voudra aussi savoir si vous souffrez de glaucome, de haute pression sanguine inadéquatement contrôlée, de maladie vasculaire périphérique, de maladie coronarienne, de maladie des reins ou du foie.

Réactions défavorables et précautions à prendre

Des symptômes comme les frissonnements dans les doigts ou les orteils devraient être signalés au médecin immédiatement et la prise de médicament devrait être interrompue.

Vous devriez de préférence éviter l'alcool ou en consommer avec modération parce qu'il pourrait créer des effets additifs sur le Phénobarbital (l'ingrédient favorisant le sommeil).

Les effets secondaires incluent les troubles de la vue, la bouche sèche, les rougeurs et la somnolence.

Comme tous les médicaments, Bellergal Spacetabs devrait être conservé hors de la portée des enfants.